

TEOFERT

γνωρίζουμε τη θρέψη

τομάτα



• **RHYZO**

• **OSIRYL**

• **AVAIL**
8-32-5

• **BOMBARDIER**

• **OSIRYL**

• **FRUKA**

• **ZIMO**

• **MOLIBORO**

• **PRIMACY**
ALPHA

• **AVAIL 3-18-20**

• **BATALLON**

• **OSIFOL Ca**

• **BOMBARDIER**

• **BOMBARDIER**
SUGAR

• **SECOFIT**

• **KATON PLUS**

• **PURE K**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| έναρξη καλλιέργειας | RHYZO Βιοδιεγέρτης ρίζας | 58% ελεύθερα L αμινοξέα που επάγουν τη δημιουργία δευτερογενών και τριτογενών ριζών. | Εφαρμογή: Στη μεταφύτευση ή για την επαναδημιουργία του ριζικού συστήματος. Δοσολογία: Από τη ρίζα 100-300 g/στρ |
| | OSIRYL Ρυθμιστής ανάπτυξης | Επιδρά στη φυσιολογία των φυτών προστατεύοντας τις ορμόνες των φυτών από την αποδόμησή τους. | Εφαρμογή: Στη μεταφύτευση ή για την επαναδημιουργία του ριζικού συστήματος. Δοσολογία: Από τη ρίζα 0,5-1 L/στρ |
| | AVAIL 8-32-5 Υγρό λίπασμα | Επάγει τη δημιουργία δυνατού ριζικού συστήματος και τη δημιουργία δυνατών βλαστών. | Εφαρμογή: 1-2 εφαρμογές κατά την έναρξη της καλλιέργειας. Δοσολογία: Από τη ρίζα 1-2 L/στρ |
| βλαστική ανάπτυξη | OSIRYL Ρυθμιστής ανάπτυξης | Επιδρά στη φυσιολογία των φυτών προστατεύοντας τις ορμόνες των φυτών από την αποδόμησή τους. | Εφαρμογή: Σε όλα τα κρίσιμα στάδια για αύξηση της παραγωγής. Δοσολογία: Από τη ρίζα 0,5-1 L/στρ |
| | BOMBARDIER Βιοδιεγέρτης | Πυκνό σκεύασμα σε αμινοξέα, φουλβικά και δευτερογενείς μεταβολίτες. | Εφαρμογή: Κάθε 15 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου. Δοσολογία: Από τη ρίζα 0,5-2 L/στρ Διαφυλλικά 3-4 L/tn |
| άνθηση, καρπόδεση | Primacy Alpha Βιοδιεγέρτης | Ενδυναμώνει τη φυσιολογία του φυτού, αυξάνει την ανθοφορία και τη καρπόδεση, δρά προληπτικά και κατασταλτικά σε ασθένειες και βακτήρια. | Εφαρμογή: Πρίν την άνθηση, καθ' όλη τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου για προστασία έναντι παθογόνων. Δοσολογία: Από τη ρίζα 400 cc/στρ Διαφυλλικά 250 cc/στρ |
| | Fruka Βιοδιεγέρτης | 60% ελεύθερα L αμινοξέα που επάγουν τη δημιουργία ανθέων και μεγιστοποιούν την καρπόδεση. | Εφαρμογή: Πρίν την άνθηση (0-20% της άνθησης). Δοσολογία: Διαφυλλικά 1 kg/tn |
| | Zimo Λίπασμα | Ειδικά σχεδιασμένο για την αύξηση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης (B: 7.1%, Mo: 10.2%, Zn: 12.8%). | Εφαρμογή: Πρίν την άνθηση (0-20% της άνθησης). Δοσολογία: Διαφυλλικά 2-4 kg/tn Από τη ρίζα 200-400 g/στρ |
| | Moliboro Λίπασμα | Ειδικά σχεδιασμένο για την αύξηση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης (P: 16.8%, K: 16%, B: 8.35%, Mo: 11%). | Εφαρμογή: Πρίν την άνθηση (0-20% της άνθησης). Δοσολογία: Διαφυλλικά 1 kg/tn Από τη ρίζα 250-350 g/στρ |

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| αύξηση μεγέθους καρπών | BATALLON Εδαφοβελτιωτικό | Εδαφοβελτιωτικό, ιδανικό για εξαντλημένα εδάφη, αυξάνει τη παραγωγή και την αποδοτικότητα της καλλιέργειας. | Εφαρμογή: Κάθε 10-14 ημέρες κατά την αύξηση των καρπών. Δοσολογία: Από τη ρίζα 1-2 L/στρ |
| | AVAIL 3-18-20 Βιοδιεγέρτης | Μειώνει τη κυριαρχία της κορυφής. Αυξάνει το μέγεθος και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καρπών. Βελτιώνει την ανθοφορία και τη καρπόδεση. | Εφαρμογή: Κάθε 10-14 ημέρες κατά την αύξηση των καρπών. Δοσολογία: Από τη ρίζα 2-3 L/στρ |
| | OSIFOL Ca Βιοδιεγέρτης | Βιοδιεγέρτης ασβεστίου, άμεση απορρόφηση και μετακίνηση μέσα στο φυτό, αυξάνει τη μετασυλλεκτική ζωή και τη συνεκτικότητα των καρπών. Περιέχει OSIRYL. | Εφαρμογή: Κάθε 10-14 ημέρες κατά την αύξηση των καρπών. Δοσολογία: Από τη ρίζα 0,5 L/στρ Διαφυλλικά 2-4 L/tn |
| | BOMBARDIER Βιοδιεγέρτης | Πυκνό σκεύασμα σε ελεύθερα αμινοξέα από βακτηριακή ζύμωση, φουλβικά και δευτερογενείς μεταβολίτες. Βελτιώνει τη παραγωγή, προστατεύει τη καλλιέργεια από συνθήκες στρες. | Εφαρμογή: Κάθε 15 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου. Δοσολογία: Από τη ρίζα 0,5-2 L/στρ Διαφυλλικά 3-4 L/tn |
| ωρίμανση | BOMBARDIER SUGAR Βιοδιεγέρτης | Ειδικός βιοδιεγέρτης που βελτιώνει τόσο τη περιεκτικότητα των καρπών σε σάκχαρα όσο και τα υπόλοιπα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. | Εφαρμογή: 2 εφαρμογές με ενδιάμεσο 15 ημέρες. Δοσολογία: Από τη ρίζα 0,5-1 L/στρ Διαφυλλικά 2-4 L/tn |
| | PURE K Βιοδιεγέρτης με βάση το κάλιο | Λίπασμα Κιτρικού Καλίου με πατενταρισμένο αμινοξύ που δρα στον μεταβολισμό των φυτών. Συμβάλλει στη μέγιστη απορρόφηση του καλίου από το φυτό σε στάδια αυξημένης ζήτησης. Οδηγεί σε ομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. | Εφαρμογή: 2 εφαρμογές με ενδιάμεσο 15 ημέρες. Δοσολογία: Από τη ρίζα 1-2 L/στρ Διαφυλλικά 2-4 L/tn |
| | KATON PLUS Υγρό λίπασμα καλίου | Υγρό λίπασμα υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο, άμεσο και ταχύτατο απορροφήσιμο. | Εφαρμογή: 2 εφαρμογές με ενδιάμεσο 15 ημέρες. Δοσολογία: Από τη ρίζα 1-2 L/στρ Διαφυλλικά 2-4 L/tn |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

| Προστατευτικά | Βιοδιεγέρτες | Εδαφοβελτιωτικά | Ασβεστούχα | Καλιούχα | Ιχνοστοιχεία |
|---------------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| PREBIOTA MAX | BOMBARDIER | PREBIOTA MAX | CAOS | KATON PLUS | BASTION |
| CUPRA GL | OSIRYL | BATALLON | ALZON CA | SECOFIT | TUNDAMIX |
| PRIMACY ALPHA | AMIFORT | ESPARTAN | VERCAL | ALZON K | ZIMO |
| MYCOGEL | ALGATONNE | FULVISOIL | PERCALCIUM | K-TON | MOLIBORO |
| E-21 | SEANERGY | ANTISALT | | | CUPRA GL |
| INTERRA | | TEOHUM | | | PURE K |
| COOPERFOL | | | | | |
| INMUNEXT | | | | | |